

Vzreja

ZAPLETI PO KOTITVI

Piše: Urška KRIVEC / Fotografija: Blaž KOŠAK

Vedno upamo na najboljše, a moramo biti vedno pripravljene tudi na težje trenutke in zaplete, do katerih lahko pride po kotitvi.



Zapleti pri psici po porodu

Ne zgodi se tako redko, da se zaplete pri psički. Čeprav so mladički pravkar prijokali na svet, imejmo najprej v mislih psičko. Primerna in kakovostna prehrana breje psice je na primer zelo pomembna za preprečevanje poporodnih težav, kot je poporodna mrzlica. Ne glede na preventivne ukrepe vedno spremljajmo vedenje psičke prva dva tedna po porodu. Malce povišana telesna temperatura po porodu še ni razlog za strah. Visoka telesna temperatura, ki vztraja več kot tri dni skupaj, pa zahteva takojšnjo veterinarsko

obravnavo. Slabo počutje psice je lahko posledica zaostale posteljice, ki se mogoče ni povsem izločila iz telesa. Med brejostjo in dojenjem odsvetujemo zdravljenje z antibiotiki in drugimi zdravili, so pa v nekaterih primerih nujno potrebni.

Izloček iz nožnice je v času po porodu sicer normalen, če pa opazimo izloček nenormalne barve, je to lahko prvi znak poporodnih težav. **Vnetje maternice** se lahko razvije nekaj dni po porodu in tudi kasneje. V večini primerov do tega pride zaradi zaostale posteljice. Pri vnetju ima lahko psica povišano

telesno temperaturo, posledica je zmanjšano izločanje mleka ali pa ga psica celo povsem izgubi. Takšno stanje zahteva takojšnjo obravnavo in zdravljenje psice.

Mastitis ali vnetje mlečne žleze je pri psicah zelo pogost pojav in se kaže v čezmerni občutljivosti prizadetega dela mlečne žleze. Vneti sesek je lahko trši in na otip boleč. Mastitis se pogosto pojavi pri psicah, ki imajo čezmerno produkcijo mleka, in pri manjšem številu mladičev, ker mleko zastaja. Še posebej pozorni bodimo v prvih nekaj dneh po porodu, ko se proizvodnja mleka še uravnava. Še zlasti v ma-

Lahko se zgodi, da bo v leglu en sam mladiček. V takem primeru so pogosto težave že pri kotitvi in marsikdaj je treba opraviti carski rez. Skrb za psico po carskem rezu ni nič posebnega. Paziti je treba le na čistočo in nego kirurške rane. Paziti moramo, da mladiček enakomerno sesa iz vseh seskov. Zelo pomembna je tudi socializacija mladička, še zlasti zato, ker je prikrajšan za druženje z bratci in sestricami. Ena od možnih rešitev je, da znanca, ki ima morda leglo podobno starih mladičkov, prosimo za dovoljenje, da naš mladiček del časa preživi v družbi z njegovimi. Čeprav imamo enega samega mladiča, ga moramo za dobro socializacijo naučiti pravil obnašanja v stiku z vrstniki.

loštevlnih leglih moramo paziti, da bodo mladiči sesali iz vseh seskov. Če ima psica res veliko mleka in mladiči zaradi sitosti ne sesajo več, lahko psici pomagamo tako, da mleko ročno iztiskamo iz seskov, ki se nam zdijo preveč polni in otrdeli. Pri tem bodimo previdni, saj lahko čezmerno ročno iztiskanje mleka povzroči še dodatno stimulacijo za proizvodnjo mleka. Vedeti pa moramo, da preventivno iztiskanje mleka iz seskov, ki ostanejo polni, pomaga pri preprečevanju mastitisa. Iztisnemo le toliko mleka, da se seski malce omehčajo in spraznijo do tolikšne mere, da niso pretirano nabrekli. Nato pa mladiče ob naslednjem hranjenju postavimo k seskom, ki so na otip bolj polni. Ko se mastitis že pojavi, veterinar po navadi predpiše antibiotike in zdravila za lajšanje bolečin. Izguba mleka je lahko posledica različnih vzrokov. Eden od njih je lahko tudi stres. Bolj občutljive psičke lahko doživijo stres zaradi smrti mladička, posledica je lahko izguba mleka. Psički moramo po porodu nuditi čim več ljubezni in podpore, hkrati pa ji moramo zagotoviti dovolj počitka.

Psička odklanja hrano in vodo. Veliko psic po kotitvi niti za trenutek ne zapusti svojih mladičev. Zato psičko nekaj dni po kotitvi malce razvajamo in ji hrano ponudimo z roke. Od nje nikar ne zahtevajmo, naj zapusti leglo, da bo prišla do vode in hrane, čeprav jo ima na voljo le nekaj metrov proč od svojih majhnih kepcev. Pomembno je, da psica zaužije dovolj tekočine. To je še zlasti pomembno, če je v leglu veliko mladičev. Včasih pomaga nekaj kapljic mleka v vodi in psica bo z veliko večjim veseljem pila.

Skrb za mladičke

Psička po navadi za mladičke poskrbi sama, zato moramo na začetku skrbeti predvsem zanjo. Kljub vsemu se še vedno lahko zgodi, da bomo morali za mladičke poskrbeti sami. Psička lahko zelo zbolijo, pogine ali pa mladiče preprosto zavrta in v takšnih primerih moramo zanje poskrbeti sami. Mladički morajo biti, tako kot pri materi, na toplem in suhem. Po vsakem hranjenju jih nežno masiramo po trebuščku, da spodbujamo izločanje blata in urina. Mladičke hranimo s posebnim, zanje izdelanim mlekom. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo po kakovosti. Naj nam ne bo škoda dodatnih stroškov za bolj kakovostno umetno

mleko, saj bodo mladički bolj zdravi, šlo jim bo bolj v slast in z njimi bomo imeli manj dela. Mladičke hranimo podnevi na dve do tri ure. Ko počivajo, jih ne budimo, saj je spanec prav tako pomemben kot hranjenje. Nikakor ne smemo pozabiti na masiranje mladičkov po vsakem obroku, saj v prvi fazi življenja potrebujejo spodbudo za pravilno prebavljanje in izločanje blata oziroma urina. Psička to stori z jezikom, tako, da mladičke masira po trebuhu. Če jih ne, moramo to storiti sami. Če smo mladičke čez dan hranili dovolj pogosto, bomo ponoči lahko malce dlje spali. Ponoči pa nas bodo mladički kar sami zbudili s cviljenjem in nam s tem sporočili, da potrebujejo hrano. Ko so mladički stari približno tri tedne, jim začnemo dajati kašice in gosto hrano, to jim ponudimo večkrat na dan. Siti mladički imajo lepo napolnjen trebuh, kar je normalno. Vseeno pa moramo biti pozorni, saj je pretirana napihnjenost trebuščka lahko posledica notranjih zajedavcev (pasjih glist), zato lahko od dveh tednov starosti naprej poskrbimo tudi za zaščito in jim preventivno dajemo pripravek proti tem nevarnim notranjim zajedavcem. Do starosti osem tednov priporočam uporabo paste proti zajedavcem namesto tablet, saj so lažje za uživanje in bolj primerne za mladičke manjših pasem.

Večje število mladičev

Pri številnejših leglih moramo paziti, da ima psica dovolj hrane. Hranimo jo glede na njene prehranjevalne navade in poskrbimo, da so obroki dovolj veliki in da hrano dobi večkrat na dan. Če je mladičkov zelo veliko, bodo psičko zelo izčrpali, zato ji lahko pomagamo tudi z dohranjevanjem mladičkov. Psičko bomo tako malce razbremenili, male kosmate kepice pa ne bodo ostale lačne. Poskrbeti pa moramo, da bodo vsi mladički pili tudi materino mleko. Dohranjevanje in naša pomoč pri skrbi za mladičke bosta psički pomagala do boljšega počutja in hitrejšega okrevanja po kotitvi. Številnejša legla povzročijo tudi večjo finančno obremenitev za vzreditelja, predvsem pa je s takšnim leglom veliko več dela pri socializaciji. Vsakega mladička posebej je treba navajati na različne dražljaje iz okolja, na sobno čistočo ter kakovostno opraviti prvo obdobje socializacije in mladiče s tem pripraviti na življenje. Več o skrbi za mladičke, o privajanju na različno hrano in socializaciji pa prihodnjč.

PREDSTAVLJAMO KONTRACEPCIJSKO SPIRALO ZA PSE.

NOVA, REVOLUCIONARNA KONTRACEPCIJA ZA PSE

BREZ OPERACIJE!

www.dogspiral.com



 Poiščite nas na Facebooku